



Дети, родители которых развелись, более, чем в два раза чаще страдают от инсульта, согласно данным нового исследования, представленным в Новом Орлеане на 63 ежегодной научной конференции *Геронтологического общества Америки (GSA)*. □

Этот вывод основан на обследовании репрезентативной группы, состоящей из более 13000 человек. Анализ данных был проведен Esme Fuller-Thomson и его коллегами из Университета Торонто.

«Мы были очень удивлены тем, насколько связь между родительским разводом и инсультом остается сильной даже после того, как мы сделали поправку на курение, ожирение, гиподинамию и потребление алкоголя», сказал Fuller-Thomson.

Из 13134 респондентов 10,4% пережили развод родителей в детстве и 1,9% сообщили, что перенесли инсульт. Когда были сделаны поправки на возраст, расу и пол, вероятность инсульта оказалась примерно в 2,2 раза выше у тех, чьи родители развелись.

Когда другие факторы риска, в том числе, социально-экономический статус, психическое здоровье и другие неблагоприятные события детства, были учтены, вероятность инсульта у тех, кто пережил развод родителей, осталась значительно повышенной.

Заседание GSA's - самая большая междисциплинарная конференция страны в области старения – проходило с 19 по 23 ноября. Примерно 3500 специалистов приняли участие в программе.

Презентация Fuller-Thomson **впервые показала связь между разводом родителей и инсультом в зрелом возрасте.**

Источник: Геронтологическое общество Америки